

FICHA TÉCNICA

CANBEST®

Pamoato de Pyrantel
Suspensión Oral

Antihelmíntico oral para perros



COMPOSICION:

Cada 100 mL contiene

Pamoato de Pyrantel (34,7 % de la base).....7,5 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

NOMBRE GENERICO: Pirantel Pamoato. (Derivado imidazotiazol).

FARMACODINAMIA:

MECANISMO DE ACCION: El Pamoato de Pyrantel es un agente bloqueador neuromuscular despolarizante. Produce parálisis en los parásitos. El efecto es irreversible.

ESPECTRO DE ACCION: Es altamente eficaz (90%) contra los Ancilostómidos comunes (*Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*), Ascaridos (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*) *Ascaris sp* , con dosis únicas de 5mg de compuesto activo/kg de peso.

Los cachorros pueden ser tratados con **Canbest®** durante la cría o destete por ejemplo a las 2, 4, 6 y 8 semanas de edad. El Pamoato de Pyrantel tiene una eficacia limitada frente a Tricúridos y ninguna frente a Céstodos y Dirofilarias.

TOXICIDAD:

Las sales del Pyrantel están libres de efectos tóxicos de hasta 7 veces la dosis terapéutica. En los perros en estudio de toxicidad crónica se han demostrado efectos patógenos cuando se administraba el fármaco a 50 o más mg/kg día durante 3 meses pero no se observaron efectos adversos cuando la dosis fue reducida a 20mg/kg/día durante el mismo período.

FARMACOCINETICA

El Pamoato de Pyrantel se absorbe en el TGI, metabolizándose rápidamente en el organismo, existiendo una pequeña cantidad intacta en el momento de ser eliminado. Por excreción urinaria en el perro, se elimina el 40% de la dosis, la mayoría como metabolitos. El perro es la única especie que excreta el fármaco o sus metabolitos en la orina más que en las heces.

El Pamoato de Pyrantel es muy poco soluble en agua lo que ofrece la ventaja de la reducida absorción por el intestino permitiendo que alcance y afecte a los Oxiuros en la parte final del intestino grueso.

INDICACIONES:

Para el control y tratamiento de parasitismo gastrointestinal de los caninos producido por: *Áscaris sp.*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Administrar por Vía Oral así:

Perros con un peso menor de 2,5kg: 1mL de **Canbest®** (10mg de la base / kg de peso vivo).

Perros con un peso mayor de 2,5kg: 1mL de **Canbest®** por cada 5kg de peso vivo (5mg de la base / kg de peso vivo).

La dosis y la frecuencia de aplicación pueden aumentarse a criterio del Médico Veterinario.

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

INTERACCIONES: Por sus propiedades colinérgicas no administrarlo conjuntamente con productos colinérgicos (como organofosforados) ya que se puede producir potenciación de la toxicidad.

VENTAJAS: Dosis única y fácil administración. No requiere dieta especial.



PRESENTACIÓN:

Jeringa por 2mL, hasta para 10kg de peso.

Jeringa por 5mL, hasta para 30kg, o más de peso.

Registro ICA No. 2814-DB

Registro Ecuador No. 3A1-8017-AGROCALIDAD

Registro Panamá No. RF-1836-11

Registro Honduras No. PF-4659

Registro Guatemala No. CO331-42-10-3045

Registro República Dominicana No. 7732

Mayor información a solicitud del Médico Veterinario.

Canbest® es marca registrada autorizada a Laboratorios Callbest Ltda.

Fabricado por Laboratorios Veterland Ltda., para Laboratorios Callbest Ltda.

Directora Técnica: Rosa Acosta O. Q.F.U.N.

Cra. 19 B No. 168 - 16 Bogotá D.C. - Colombia.

PBX (57-1) 6789851

contacto@laboratorioscallbest.com