

FICHA TÉCNICA

OXIBEST® 50

Oxitetraciclina
Solución Inyectable

Antibiótico bacteriostático de amplio espectro



COMPOSICIÓN:

Cada mL contiene:

Oxitetraciclina HCl.....50 mg

Excipientes c.s.p..... 1 mL

DESCRIPCIÓN:

Oxibest® 50 es un antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de Anaplasmosis y de las enfermedades infecciosas producidas por *Streptococcus sp.*, *Shigella sp.*, *Clostridium sp.*, *Escherichia coli*, *Pasteurella sp.*, *Haemophilus sp.*, *Leptospira sp.*, *Campylobacter sp.*, *Rickettsia sp.*, *Hexamitia sp.*, *Listeria sp.* y *Bacteroides sp.*

INDICACIONES:

Oxibest® 50 está indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y gatos para el tratamiento de Anaplasmosis, Carbón sintomático, Carbón bacteridiano, Edema maligno, Tétano, Disentería vibriónica, Vaginitis, Septicemia hemorrágica, Peritonitis, Pielonefritis, Actinomicosis, Listeriosis e infecciones cutáneas (a causa de heridas, castraciones, absesos).

ADMINISTRACIÓN:

Oxibest® 50 se puede administrar por Vía Intramuscular, Subcutánea e Intrauterina.

DOSIS:

Anaplasmosis: Aplicar 20mL por cada 100kg de peso vivo o 2mL por cada 10kg de peso vivo. Repetir el tratamiento durante 3 a 4 días.

Enfermedades infecciosas:

- **Animales con peso mayor de 100kg:** 10mL por cada 100kg de peso vivo.
- **Animales con peso menor de 100kg y especies menores:** Aplicar 2mL por cada 10kg de peso vivo.

Repetir el tratamiento durante 3 a 4 días.

Lavados vaginales e intrauterinos: Disolver (mezclar) 30 a 40 mL de **Oxibest® 50** con 100mL de agua destilada o solución salina. Repetir cada 24 a 48 horas por tres (3) veces.

Para aplicar grandes volúmenes debe escogerse la Vía Intramuscular.

Las dosis y la frecuencia de aplicación pueden variar a criterio del Médico Veterinario.

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consérvese en lugar fresco, protegido de la luz, a temperatura no superior a 30°C.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 6 días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

PRESENTACIÓN: Frasco por 500mL.

Registro ICA No. 2827-DB

Registro Ecuador No. 2C-8034-AGROCALIDAD

Registro Panamá No. RF-1852-11



Mayor información a solicitud del Médico Veterinario.

Oxibest® 50 es marca registrada autorizada a Laboratorios Callbest Ltda.
Fabricado por Laboratorios Veterland Ltda., para Laboratorios Callbest Ltda.
Directora Técnica: Rosa Acosta O. Q.F.U.N.
Cra. 19 B No. 168 - 16 Bogotá D.C. - Colombia.
PBX (57-1) 6789851
contacto@laboratorioscallbest.com